

SMITH & NEPHEW RECORD	
ITEM:	Acticoat Absorbent IFU (Russian)
CODE:	
THIS BSC:	xxxxxxxx / 55071
PREV BSC:	
DATE:	12/01/2015
REVISION:	03

STRAWBERRY RECORD			
JOB NO:	1905		
DIMS:	90 x 210mm		
COLOURS	■ Black		
Match to coated stock PMS			
ARTWORK	MP	CHECKED	SG

(RU)

smith&nephew

## ACTICOAT<sup>®</sup> ABSORBENT

Содержит нано кристаллическое серебро Силкрист<sup>®</sup>,  
Покрывается серебром абсорбирующая антимикробная барьерная повязка

**СТЕРИЛЬНО** R

Стерилизовано электронным пучком. Не используйте, если упаковка открыта или повреждена. Только для одноразового использования. Не стерилизовать повторно. Хранить в сухом месте (<25 °C/77 °F). Не подвергать воздействию температуры выше 50 °C/120 °F. Хранить в защищенном от света месте.

### Описание

ACTICOAT<sup>®</sup> Absorbent состоит из абсорбирующего альгината, покрытого нанокристаллическим серебром. Нанокристаллическое серебро обеспечивает эффективный противомикробный барьер от микробного загрязнения, защищая рану от инвазивных патогенных микроорганизмов, тем самым способствуя более быстрому заживлению. При наличии экссудата альгинат превращается в гель и помогает поддерживать влажную среду раны.

### Показания

ACTICOAT Absorbent применяется в качестве абсорбирующей повязки для ран с уровнем экссудата от умеренного до высокого, поверхностных ран и ран с поражением до фасциального слоя, таких как пролежни, трофические и диабетические язвы, ожоги, донорские и реципиентные участки. ACTICOAT Absorbent может оставаться на ране до 7 дней. ACTICOAT Absorbent может использоваться при инфицированных ранах. Если продукт применяется при инфицированных ранах, раны должны проверяться и обрабатываться в соответствии с местным клиническим протоколом.

### Противопоказания

- Не используйте для пациентов с известной чувствительностью к серебру.
- Не используйте для пациентов с известной чувствительностью к альгинатным повязкам.
- Не используйте для пациентов, проходящих МРТ (магнитно-резонансную томографию).
- Не используйте на сухих или не экссудирующих ранах.

### Меры предосторожности

- Не используйте, если цвет продукта не является равномерным.
- В то время как ACTICOAT Absorbent помогает в лечении ран с тенденцией к незначительному кровотечению, он не предназначен для использования в качестве хирургической губки или достижения гемостаза сильно кровоточащих ран.
- ACTICOAT Absorbent не совместим с продуктами на основе нефтепродуктов, такими как вазелин.
- Избегайте контакта с электродами или проводящими гелями во время электронных измерений, например, ЭЭГ и ЭКГ.

- Убедитесь, что перевязочные материалы полностью удалены из полостей, пазух и т. д.
- ACTICOAT Absorbent может использоваться для недоношенных детей (менее 37 недель), только если клиническая польза перевешивает потенциальные риски. Нет доступных клинических данных для данной возрастной группы, а доступные ограниченные данные относятся к применению для новорожденных. ACTICOAT Absorbent является продуктом для одноразового применения. В случае использования более чем для одного пациента может возникнуть перекрестное заражение или инфекция. Кроме того, противомикробные свойства продукта будут нарушены. При вскрытии упаковки нарушается стерильная защита, соответственно, неиспользованные повязки не должны сохраняться для будущего использования.

### Инструкция по применению

- При необходимости должна быть выполнена очистка раны в соответствии с местным клиническим протоколом. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ физиологический раствор.
- Извлеките повязку ACTICOAT Absorbent, используя чистую технику.
- Выберите повязку, несколько превосходящую рану по размеру, и поместите повязку непосредственно на рану, убедившись, что закрыта вся поверхность.
- Повязка не требует увлажнения перед использованием, так как она должна использоваться только на экссудирующих ранах.
- Обрежьте повязку до нужной формы. Повязка не предназначена для перекрытия краев раны, поэтому выступающие края повязки должны быть обрезаны или завернуты на поверхность раны.
- Зафиксируйте соответствующей вторичной повязкой, которая поможет поддерживать влажную среду раны. Повязка должна сохраняться влажной, но не настолько влажной, чтобы возникла мацерация ткани.
- Меняйте повязку в зависимости от количества экссудата и состояния раны. Повязку можно оставлять на срок до семи дней.
- Повязка может прилипнуть, если используется на ранах с небольшим количеством экссудата. Если повязку не удается легко снять, увлажните или смочите повязку, чтобы облегчить снятие и избежать нарушения заживления раны.

Примечание. ACTICOAT Absorbent может вызвать кратковременное изменение цвета окружающей кожи.

### Доступность продукта

Код	Размер	Доступность
66001760	5 см x 5 см / 2 дюйма x 2 дюйма	5 шт. в коробке
66000840	2 см x 30 см / 3/4 дюйма x 12 дюймов	5 шт. в коробке
66000841	10 см x 12,5 см / 4 дюйма x 5 дюймов	5 шт. в коробке

### Производитель

Smith & Nephew Medical Limited, 101 Hesse Road, Hull HU3 2BN, England  
Торговые знаки Smith & Nephew ©Smith & Nephew Дата выпуска 01/2015  
www.smith-nephew.com

55071

CE

0086